


Travel Medicine

Porntep suandork M.D.

**PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE SPECIALIST
BANGKOK HOSPITAL**



Geosentinel by diagnostic category and region (2007-2011)



การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง

- ประเมินภาวะสุขภาพของนักท่องเที่ยว อายุ เพศ
- โรคประจำตัว
- ประวัติการแพ้ยา
- ระบาดวิทยาของโรคติดต่อในประเทศที่เดินทาง
- ประวัติการได้รับวัคซีน
- พิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรค

Vaccine for travelers

1. Routine vaccines
2. Required vaccines (Yellow fever vaccine, Meningococcal vaccine)
3. Recommended vaccines
 - Typhoid vaccine
 - Hepatitis A vaccine
 - Japanese encephalitis vaccine
 - Influenza vaccine
 - Rabies vaccine
 - Cholera vaccine

Yellow fever vaccine (Stamaril SP)

- ผู้เดินทางไปประเทศไทย เสี่ยงในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้
- ควรได้วัคซีนอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

Table 3-23. Vaccine to prevent yellow fever

VACCINE	TRADE NAME (MANU- FACTURER)	AGE	DOSE	ROUTE	SCHEDULE	BOOSTER
17D yellow fever vaccine	YF-Vax (Sanofi Pasteur)	≥9 months ¹	0.5 mL ²	SC	1 dose	Not recommended for most ³

Abbreviation: SC, subcutaneous.

¹ Ages 6–8 months and ≥60 years are precautions and age <6 months is a contraindication to the use of yellow fever vaccine.

² YF-Vax is available in single-dose and multiple-dose (5-dose) vials.

³ For further details regarding revaccination, see "Vaccine Administration" in this section.